


關心孩童 語暢問題

HHE-HE-LLO!



編碼:6300/ T026

復健中心/語言治療室製作

諮詢電話：(049) 2912151轉4505/4506

復健科專科醫師審查(2022.12)

參考資料:<http://kidshealth.org/en/kids/stuttering.html>

01 什麼是語暢問題?

在說話當中所呈現的字詞間連續性、順暢性、速度、用力程度出現問題，就會被稱作語暢障礙，也就是俗稱的「口吃」。

02 正常發展過程中的言語不流暢

孩童在早期語言發展時，因詞彙量不足以及語言結構尚未發展成熟，導致說話時常有停頓或是重複的現象，為正常的言語不流暢；但若孩童說話時每一百個字出現超過三次不流暢，或不流暢出現時伴隨異常的動作/表情時，那便稱之為口吃。

03 表現方式

• 口語部分

1. 重複:音或字的重複，可能出現在句中或是句首，例如：「我要去去去醫院。」
2. 延長:音的延續，可能有聲或無聲，例如：「我要去…醫院。」

• 非口語部分

1. 臉部表情:說話前/時臉部張力過大，或是出現較不同之表情。
2. 肢體動作:說話前/中出現不同之動作，例如手部搖擺、敲大腿等。

04 相關因素

1. 家族中是否有其他人有類似狀況?復原狀況如何?
2. 孩童是否有聽力、語言或其他問題?



05 家屬能夠做什麼?

1. 不要在缺少診斷下自行判定孩童是否有口吃，避免說話成為孩子的壓力源。
2. 降低說話速度、不要打斷孩童說話，耐心聽完。孩子的語言正在發展，因此傾聽的重點在說話內容而非流暢度。
3. 觀察並記錄孩子容易發生口吃的情境並提供給醫師與治療師。

