

腫瘤傷口護理

原因

1. 組織受到腫瘤壓破與侵犯。
2. 微血管破裂與組織的壞死。
3. 厭氧細菌的群落增生。
4. 癌細胞沿著血管與淋巴管擴張造成栓塞。

潰爛傷口特性

1. 出血。
2. 疼痛。
3. 惡臭。
4. 大量分泌物。



傷口惡臭處置

1. 清瘡術：清除壞死組織，減少壞死組織所引起的腐味。
2. 一般外科手術或以內科清瘡法如特殊藻凝膠或酵素製劑。
3. 消炎藥：可給予消炎藥或直接將藥物直接灑於傷口。
4. 臭味吸附之敷料：可選擇含活性碳之敷料（Astisorb or carbonet），能吸收臭味，也具有不沾粘及吸附分泌物之特性，若為頭頸部部位可以活性碳口罩覆蓋於最外層，以減輕惡臭味道。

5. 可在睡前更換一次藥，讓病人安心舒適的休息。

6. 選擇沖洗液：

生理食鹽水：傷口滲出液多。

優碘：對惡臭的減輕有明顯改善

雙氧水：能輕易去除分泌物或壞死組織，需稀釋後才可使用。

醋酸（Acetic acid）：需稀釋後才可使用

◆不論使用任何溶液清洗後，均需再用生理食鹽水清洗。

7. 維持空氣流通：室內放置木碳、咖啡渣、芳香精油或開窗、空氣清淨機。



8. 出血處理：選擇網狀的合成聚合物不沾粘的敷料，如海藻膠敷料，而有出血厲害情形，應至醫院請醫師協助處理。

9. 疼痛處理：

非傷口換藥時疼痛：選擇消炎藥、止痛劑來止痛。

換藥時疼痛：予局部性止痛劑於換藥前 20—30 分鐘前給予止痛藥。

資料來源：照片由網路截取