


化療滲漏預防及處置護理指導



Port-A(人工靜脈血管)

多次化學藥物治療時，醫師會建議裝置人工血管，常見為Port-A導管(人工靜脈血管)。

滲漏的症狀

注射部位疼痛、針刺感、燒灼感、腫脹、發熱等不適。



滲漏的預防

1. 治療前，先排空大小便，以減少治療時下床的次數。
2. 治療中，不可拉扯靜脈注射器或對注射部位有擠壓的動作。
3. 若需沐浴、更衣、下床活動，或注射部位有脫落時，通知護理師協助處理。

滲漏的處理

1. 立即停止輸注，並回抽殘餘的藥物及血液，減少藥物滲漏血管外。

2. 針頭、導管拔除後，依醫師開立之藥膏，局部塗擦，以無菌繃帶包紮。
3. 禁止對滲漏部位施壓力或自行塗抹非醫師指示之藥物，如：牙膏---等。
4. 依藥物之不同，提供冷敷或熱敷，以促進血管收縮，減少藥物浸潤。



5. 將藥物滲透部位抬高超過心臟部位至少4~8小時。
6. 密切觀察局部組織變化。若局部組織持續惡化或疼痛未能緩解，醫師會評估是否需要進行外科擴創或補皮手術。

資料來源：照片由網路截取